



REPÉRER

Les signes d'alerte

Ces signes ne sont pas spécifiques.

Facteurs de risque, facteurs aggravants

Antécédent de violences familiales dans l'enfance

Séparation récente

Grossesse

Isolement social

Plaintes

Plaintes vagues et inexplicables

Symptômes physiques chroniques inexplicables : douleurs (pelviennes, lombaires, abdominales, céphalées), asthénie

Symptômes physiques multiples

Comportement

Consultations fréquentes

Retard à consulter, oublis de rendez-vous

Problème d'observance (traitement, conseils)

Incohérence dans le récit

Signes psychiques

Dépression

Etat de stress post traumatique :
savoir le diagnostiquer

Anxiété

Troubles du sommeil

Idées suicidaires, tentatives de suicide

Addictions

Troubles du comportement alimentaire

Signes physiques

Blessures/ traumatismes inexplicables/répétés

Douleurs chroniques : pelviennes, lombaires, abdominales, céphalées

Asthénie

Maladie chronique déséquilibrée

Santé sexuelle et reproductive

Grossesses non désirées, IVG

IST répétées

Liés au partenaire

Dyspareunies
Fausse couche
Métrorragie
Manque de soins prénataux

Liés aux enfants

Trop attentionné
Intrusif
Agressif

Rupture dans le comportement
Repli sur soi ou hyperactivité
Régression des acquisitions ou Maturité précoce
Troubles alimentaires
Troubles du sommeil
Douleurs répétées
Rupture scolaire
Actes délictueux
Mise en péril de soi